



NEPOVINNÉ A DOPORUČENÉ OČKOVÁNÍ

Nehrazené ze zdravotního pojištění, event. při splnění určitých podmínek je část hrazena.
Ke každé dávce očkovací látky bude navíc účtována částka za aplikaci (200 Kč injekčně, 100 Kč ústy).

Vakcína	Detaily	Cena
Rotarix	proti rotavirové infekci	2 000 Kč za 1 dávku (celkem 2 dávky)
	od 6. týdne, podáváno ústy	
Vaxneuvance	proti pneumokokovým infekcím (15 valentní vakcína)	2 000 Kč za 1 dávku (celkem 3 dávky)
	od 6. týdne, podání injekčně	plně hrazené zdravotní pojišťovnou, pokud jsou první dvě dávky aplikovány do 7 měsíce věku
Bexsero	proti meningokokové infekci (skupiny B)	2 300 Kč za 1 dávku (celkem 3, resp. 2 dávky)
	od 2. měsíce, podání injekčně	do 12. měsíce a mezi 14.-16 rokem věku plně hrazeno zdravotní pojišťovnou
MenQuadfi	proti meningokokové infekci (skupiny A, C, W, Y)	1 400 Kč za 1 dávku (celkem 1 dávka)
	od 1 roku, podání injekčně	mezi 1.-2. rokem a mezi 14.- 16 rokem věku plně hrazeno zdravotní pojišťovnou
Varilrix	proti planým neštovicím	1 800 Kč za 1 dávku (celkem 2 dávky)
	od 9. měsíce, podání injekčně	
Havrix	proti hepatitidě typu A	0,5 ml - 1 200 Kč za 1 dávku (celkem 2 dávky)
	od 1 roku, podání injekčně	1,0 ml - 1 500Kč za 1 dávku (celkem 2 dávky)
Gardasil 9	proti lidským papilomavirům (proti HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58)	3 600 Kč za 1 dávku (celkem 2 dávky, od 15 let 3 dávky)
	od 11 let, podání injekčně	mezi 11.-15. rokem hrazené zdravotní pojišťovnou
FSME Immun	proti klíšťové meningoencefalitidě	0,25 ml - 1 000 Kč za 1 dávku (celkem 3 dávky)
	od 1 roku, podání injekčně	0,5 ml - 1 100 Kč za 1 dávku (celkem 3 dávky)
VaxigripTetra	proti chřipce	dle aktuálního vývoje ceny (obvykle 500 Kč)
	od 6. měsíce, podání injekčně	
Mesocain/ EMLA	zněcitlivující krém před aplikací očkovací látky	100 Kč
	v případě zájmu se s námi domluvte při rezervaci termínu očkování, je nutné dorazit 15-30 minut před plánovaným časem očkování	

V Praze dne 16.6.2025, doc. MUDr. Jan David, Ph.D.

Váš průvodce očkováním dětí: povinné a doporučené vakcíny v Česku

Praktický průvodce pro rodiče

Očkování je jedno z nejčastějších témat, o kterých se rodiče zajímají - a zároveň jedno z nejvíce matoucích. Které vakcíny jsou povinné, které doporučené, které jsou zdarma a za které je třeba zaplatit? Tento průvodce vysvětluje, jak funguje očkování dětí v Česku.

Jak funguje očkování

V Česku se dětské vakcíny dělí do dvou hlavních skupin:

 **Povinné vakcíny** – stanovené zákonem. Děti jsou očkovány prostřednictvím svého pediatra. Povinné vakcíny chrání děti proti závažným a potenciálně život ohrožujícím nemocem. Tyto vakcíny jsou součástí **očkovacího kalendáře ČR** a jejich podání je hrazeno ze zdravotního pojištění.

 **Doporučené vakcíny** – nejsou povinné zákonem, ale pediatři je často doporučují, protože chrání proti běžným nebo nebezpečným onemocněním. Doporučené vakcíny mohou být také v určitém věku hrazeny ze zdravotního pojištění (např. protipneumokokové a protimeningokokové vakcíny), obvykle jsou však za přímou úhradu s možností částečné kompenzace cestou žádosti na zdravotní pojišťovnu.

Přehled vakcín v ČR

Vakcína	Povinné / Doporučené	Dávky	Pojišťovna	Věk / poznámky
Hexavakcína	 Povinné	3 + revak.	Ano	2., 4., 11–13 měsíc; revak. 5–6 let
MMR	 Povinné	2	Ano	13–18 měsíc; 5–6 let
BCG	 Povinné u rizikových	1	Ano	Jen rizikové skupiny
Pneumokok	 Doporučené	3–4	Ano/částečně	nejlépe do roka věku
Rotavirová	 Doporučené	2–3	Ne/částečně	do 24 týdnů
Meningokok B	 Doporučené	2–3	Ano/částečně	nejlépe do roka věku, poté 14–16 let
Meningokok ACWY	 Doporučené	1–2	Ano / částečně	nejlépe do dvou let, poté 14–16 let

HPV	 Doporučené	2–3	Ano/ částečně	Obvykle 11–15 let
Chřipka	 Doporučené	1-2 ročně	Ne / částečně	Doporučeno rizikovým skupinám
Klíšťová encefalitida	 Doporučené	3 + posil.	Ne / částečně	Doporučeno od 1 roku
Infekční hepatitida A	 Doporučené	2	Ne/ částečně	Doporučeno od 1 roku
Plané neštovice	 Doporučené	2	Ne/ částečně	Doporučeno od 1 roku

✓ Povinné vakcíny

- Odmítnutí povinného očkování může vést k **pokutě**.
- Neočkované děti mohou mít **omezený přístup do mateřských škol** (podle platné legislativy).
- Podání vakcín se **zaznamenává do očkovacího průkazu dítěte**.

Kde se očkuje?

- Většinu vakcín podává **váš pediatr**.
- Některé **doporučené vakcíny** lze také získat na:
 - **Očkovacích centrech**
 - **Ambulancích cestovní medicíny**
- **Vždy se poraďte se svým pediatrem** před zahájením jakéhokoli očkování.

Postup po očkování

- 15-30 minut po aplikaci očkovací látky se doporučuje zdržovat se v blízkosti ordinace lékaře nebo zdravotního střediska.
- 24 hodin po očkování se doporučuje dodržovat klidový režim bez sportovních aktivit.

Co by měli rodiče dělat

- ✓ **Zaregistrovat dítě u pediatra včas**
- ✓ **Uchovávat očkovací průkaz dítěte** na bezpečném místě
- ✓ **Zajímat se o doporučené vakcíny** a poradit se s pediatrem
- ✓ **Prověřit možnosti úhrady ze zdravotního pojištění**
- ✓ **Nebát se klást otázky** — jde o zdraví vašeho dítěte

Očkování dětí je důležitým nástrojem prevence závažných onemocnění a jeho plánování by mělo probíhat ve spolupráci s pediatrem.

Tento průvodce vznikl ve spoluautorství s docentem Janem Davidem a **Soukromou pediatrickou a nutriční ambulancí Dr.David, s.r.o.**, která se mimo jiné věnuje očkování dětí a mladistvých. Více informací naleznete na <https://drdavid.cz/>.

Očkovací schéma k zajištění dostatečné ochrany v časném věku a plán preventivních prohlídek v prvních 2 letech života

Druhy očkování

Povinná

Infanrix hexa	záškrt, tetanus, černý kašel, poliomyelitida, HiB, hepatitida B
MMR	spalničky, zarděnky, příušnice

Doporučená hrazená (v určitém věku) pojišťovnou

		Podmínky úhrady
Prevenar 20	pneumokoky	podání 3 dávek do 7 měsíců věku
Bexsero	meningokoky B	zahájení do 1. roku a mezi 14. - 16. rokem
Menquadfi	meningokoky A, C, W, Y	věk 12 - 24 měsíců a 14 - 16 let
Gardasil 9	lidský papilomavirus (HPV)	věk 11 - 15 let

Doporučená nehrazená pojišťovnou - příspěvek pojišťovny přes bonus programy

Rotarix	rotaviry	od 6. týdne
Varilrix	plané neštovice	od 12. měsíce (ideálně před školkou)
Vaqta/Havrix	žloutenka typu A	od 12. měsíce (ideálně před školkou)
FSME	klíšťová meningoencefalitida	od 12. měsíce

Schéma 1		
Věk	Preventivní prohlídka	Očkování
dle propouštění z porodnice	ANO	Beyfortus pokud nebyl podán v porodnici
14 dní	ANO	Beyfortus pokud nebyl podán dříve
6 týdnů	ANO	1. Rotarix + 1. Prevenar 20
3 měsíce	ANO	2. Rotarix + 2. Prevenar + 1. Infanrix hexa
4 měsíce	ANO	1. Bexsero
5 měsíců	NE	3. Prevenar 20 + 2. Infanrix hexa
6 měsíců	ANO	2. Bexsero

Schéma 2		
Věk	Preventivní prohlídka	Očkování
dle propouštění z porodnice	ANO	Beyfortus pokud nebyl podán v porodnici
14 dní	ANO	Beyfortus pokud nebyl podán dříve
6 týdnů	ANO	1. Rotarix
3 měsíce	ANO	2. Rotarix + 1. Prevenar + 1. Infanrix hexa
4 měsíce	ANO	1. Bexsero
5 měsíců	NE	2. Prevenar 20 + 2. Infanrix hexa
6 měsíců	ANO	2. Bexsero
6,5 měsíce	NE	3. Prevenar 20

Schéma 3		
Věk	Preventivní prohlídka	Očkování
dle propouštění z porodnice	ANO	Beyfortus pokud nebyl podán v porodnici
14 dní	ANO	Beyfortus pokud nebyl podán dříve
6 týdnů	ANO	1. Rotarix
3 měsíce	ANO	2. Rotarix + 1. Infanrix hexa
3,5 měsíce	NE	1. Prevenar 20
4 měsíce	ANO	1. Bexsero
5 měsíců	NE	2. Infanrix hexa
5,5 měsíce	NE	2. Prevenar 20
6 měsíců	ANO	2. Bexsero
6,5 měsíce	NE	3. Prevenar 20

Pokračující schéma společné pro všechna předchozí		
Věk	Preventivní prohlídka	Očkování
8 měsíců	ANO	NE
10 měsíců	ANO	NE
12 měsíců	ANO	3. Infanrix hexa (+/- 4. Prevenar 20)
od 12,5 měsíců	NE	4. Prevenar 20 3. Bexsero Menquadfi
18 měsíců	ANO	MMR

Očkovací schéma lze vždy upravit dle aktuálního stavu pacienta či potřeby.